



FAKULTNÍ NEMOCNICE KRÁLOVSKÉ VINOHRADY
ŠROBÁROVA 1150/50, 100 34 PRAHA 10
Ústav laboratorní diagnostiky, Hematologická laboratoř

**Pokyny před odběrem krve na vyšetření primární hemostázy
(PFA-200 a agregace)**

Vážení rodiče,

ošetřující lékař Vašeho dítěte indikoval vyšetření funkčních vlastností krevních destiček, které je značně ovlivněno celou řadou faktorů. Z toho důvodu prosíme o vyplnění a do držení následujících pokynů, které mohou významně ovlivnit výsledek vyšetření.

Příjmení a jméno dítěte:

Rodné číslo dítěte:

Dítě pravidelně užívá:

Antiagregační léčba:

Kyselina ASA (např. Acylpyrin, Anopyrin, Aspirin, Godasal, Stacyl, Vasopirin)

Clopidogrel (Plavix, Trombex, Plavocorin, Platel, Zyllt)

Ticagrelor (Brilique)

Prasugrel (Effient)

Ticlopidin (Apo-Tic, Tagren)

Jiná: _____

Antikoagulační léčba (Warfarin, Eliquis, Xarelto, Pradaxa, Lixiana, Clexane, Fraxiparine, Zibor)

Antidepresiva - jaká: _____

Pokyny před odběrem krve:

*Pokud v době **deseti dnů** před vyšetřením bude potřeba u Vašeho dítěte tlumit bolest nebo teplotu, užíjte přípravky s obsahem paracetamolu (Paralen, Panadol, Paramax), není-li u Vašeho dítěte kontraindikován. Na bolest či teplotu neužívejte léčiva s obsahem kyseliny acetylsalicylové (Acylpyrin, Superpyrin, Aspirin) ani nesteroidní antirevmatika (Ibuprofen, Ibalgin, Diclofenac, Voltaren...). Také u dítěte vysadte přípravky z bylin a potravinové doplňky, zejména ty s obsahem výtažků z Gingo biloba.*

V případě nejasností a/nebo dotazů se můžete obrátit na klinicka.farmacie@fnkv.cz nebo na tel. 2 6716 3630.

1 den před vyšetřením doporučujeme vyvarovat se: pití silného černého čaje, konzumace česneku, zázvoru, tučných jídel a větší fyzické zátěže.

K odběru se s dítětem dostavte na lačno!

U dítěte se nepodařilo splnit následující požadavek doporučení: _____
